



Medicina General

Free Practice Test — 30 Real Exam-Style Questions

with full answer key & explanations

**Unlock the full bank of 3708 questions
+ unlimited timed mock exams + mistake book**

Practice on the web: <https://certs.theorypractice.app/medicina-general>

\$2.99 / week · \$6.99 / month · cancel anytime

What you unlock: all 3708 questions • unlimited timed mock exams • mistake book • instant explanations

Study offline on the free app — search your exam on the App Store or Google Play



Unlock all 3708 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/medicina-general>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start



Practice Questions

Try all 30 first, then check the answer key at the back.

Want the other 3678+ questions & full timed mock exams? Unlock at
<https://certs.theorypractice.app/medicina-general>

1. son causa de hematuria de origen glomerular todas, excepto:

- A. tumos de Wilms.
- B. lupus eritematosos sistémico.
- C. nefropatía por Ig A.
- D. síndrome de Good- Pasture.

2. uno de estos hallazgos no es característico del Fracaso Renal agudo:

- A. hipercalcemia.
- B. hiperpotasemia
- C. hiponatremia.
- D. acidosis metabólica.

3. ¿Cuál de los siguientes datos no es propio del síndrome hemolítico?:

- A. adenopatías.
- B. hiperbilirrubinemia.
- C. incremento de la LDH sérica.
- D. esplenomegalia.

Study offline on the free app — search your exam on the App Store or Google Play

4. ante una oftalmoplejía internuclear bilateral en paciente joven, se debe sospechar:

- A. esclerosis múltiple
- B. glioma de tronco
- C. hematoma pontino
- D. infarto isquémico Pontigo

5. en la Enfermedad de la Hb H, NO se produce:

- A. eritropoyesis ineficaz.
- B. anemia.
- C. esplenomegalia.
- D. hemólisis.



Unlock all 3708 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/medicina-general>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start



6. a un objeto (ropa, muebles, instrumental médico contaminado...) se le denomina ?

- A. fómite.
- B. portador.
- C. agente infeccioso.
- D. vector.

Want the other 3678+ questions & full timed mock exams? Unlock at
<https://certs.theorypractice.app/medicina-general>

7. en la neuralgia esencial del glosofaríngeo, señale la opción incorrecta:

- A. no tiene factores desencadenantes.
- B. el dolor está localizado en la amígdala, en base lingual, en la pared lateral faríngea o en el oído.
- C. es agudo, intenso, dura segundos y desaparece
- D. es mucho menos frecuente que las de trigémino

8. ante un fracaso del tratamiento durante 4 meses de una prostatitis bacteriana crónica se puede optar por una pauta de tratamiento supresivo de larga duración. ¿Qué antibiótico se utilizaría?

- A. cualquiera de las demás respuestas
- B. fluoroquinolona
- C. nitrofurantoína
- D. cotrimoxazol

9. entre las características principales de un buen entrevistador NO figura:

- A. alta reactividad
- B. calidez
- C. asertividad
- D. empatía

Study offline on the free app — search your exam on the App Store or Google Play

10. señale la afirmación menos apropiada para la CPRE urgente por colangitis.

- A. si la esfinterotomía es amplia, no es necesaria la colocación de endoprótesis o drenaje nasobiliar.
- B. la descompresión endoscópica disminuye más la mortalidad que la percutánea o la quirúrgica.
- C. siempre se debe hacer esfinterotomía, salvo coagulopatía o trombopenia.
- D. la mortalidad de la colangitis es elevada, cercana al 90%.



Unlock all 3708 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/medicina-general>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start



11. respecto al suicidio en la infancia y adolescencia es cierto que :

- A. la comorbilidad con la depresión es la más frecuente
- B. es excepcional la tentativa de suicidio sin premeditación
- C. la prevalencia del suicidio ha disminuido en la última década
- D. el tratamiento de la tentativa de suicidio rara vez previene una nueva tentativa

12. la microesferofaquia se asocia con más frecuencia a:

- A. síndrome de Weill-Marchesani.
- B. síndrome de Lowe.
- C. homocistinuria.
- D. síndrome de Alport.

Want the other 3678+ questions & full timed mock exams? Unlock at
<https://certs.theorypractice.app/medicina-general>

13. señale la respuesta correcta acerca del síndrome del glucagonoma

- A. la histología muestra necrosis de los estratos epidérmicos superiores
- B. las mucosas están respetadas
- C. las lesiones cutáneas respetan las regiones intertriginosas
- D. los tumores suelen ser resecables en el momento del diagnóstico.

14. en la Topografía corneal, señale la opción incorrecta:

- A. una cornea normal es prolata y con un valor de asfericidad Q de -0.12
- B. un mapa tangencial muestra una mayor sensibilidad a los cambios periféricos con menor regularidad de la curvatura que un mapa axial.
- C. las corneas oblatas aumentan el problema de las aberraciones esféricas.
- D. el análisis de frente de onda indica la presencia de aberraciones de alto orden como astigmatismo en coma o trébol.

15. para la obtención de imágenes del Bazo, ¿qué radiofármaco utilizarías?:

- A. hematíes denaturalizados-Tc99m.
- B. hM-PAO-Tc99m.
- C. mAG 3-Tc99m.
- D. silicato de Y90.

Study offline on the free app — search your exam on the App Store or Google Play



Unlock all 3708 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/medicina-general>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start

Unofficial study material · not affiliated with any certifying body



16. la reacción a la lepromina o o reacción de Mitsuda:

- A. tiene interés pronóstico
- B. carece de interés pronóstico
- C. tiene interés diagnóstico
- D. sólo tiene interés diagnóstico en los ancianos

17. el analgésico de elección en el embarazo es:

- A. paracetamol
- B. aspirina
- C. meperidina
- D. ibuprofeno

18. respecto al quiasma no es cierto:

- A. las fibras maculares nasales cruzan en la en la parte anterior del quiasma.
- B. las fibras maculares temporales siguen una trayectoria directa a través del quiasma como un fascículo de fibras no cruzadas
- C. la fibras extramaculares procedentes de la retina inferonasal cruzan en el quiasma anteriormente en la rodilla de Wilbrand antes de pasar a la cintilla óptica.
- D. la fibras extramaculares superonasales cruzan directamente a la cintilla del lado opuesto.

Want the other 3678+ questions & full timed mock exams? Unlock at
<https://certs.theorypractice.app/medicina-general>

19. en la fibrilación auricular (FA), señale la respuesta incorrecta:

- A. la anticoagulación crónica en la FA solitaria está indicada preferentemente en pacientes jóvenes (< 60 años) y sin factores de riesgo.
- B. el riesgo de accidente cerebro-vascular embolígeno es similar en la FA paroxística que en la FA crónica.
- C. la amiodarona es más efectiva en prevenir recaídas en FA y mantener el ritmo sinusal que los fármacos IA y IC.
- D. en el tratamiento crónico la digoxina habitualmente es insuficiente para el control de la frecuencia durante el ejercicio.

20. para la prevención de la neumonía asociada a ventilación mecánica, se recomienda que la presión del neumotaponamiento del tubo orotraqueal se sitúe entre:

- A. R5-30 cmH2O
- B. R0-25 cmH2O
- C. Q5-20 cmH2O
- D. Q0-15 cmH2O



Unlock all 3708 questions + timed mock exams
→ <https://certs.theorypractice.app/medicina-general>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start



21. cuando hablamos de marcapasos; ¿qué se entiende por fenómeno Crosstalk?

- A. es la inhibición inapropiada del canal ventricular por detección del estímulo auricular
- B. es la despolarización simultánea del ventrículo o la aurícula, ocasionada por un latido ventricular o auricular espontáneo y por un estímulo ventricular o auricular procedente del marcapasos
- C. es la emisión de un estímulo por parte del marcapasos, durante el período refractario absoluto de la aurícula o del ventrículo, que será inefectivo
- D. es la pérdida del canal auricular en un marcapasos DDD

Study offline on the free app — search your exam on the App Store or Google Play

22. la taquicardia de asa cerrada, es:

- A. es una taquicardia mediada por el marcapaso.
- B. ocurre más frecuentemente en los VVI.
- C. ocurre raramente en DDD.
- D. se relaciona con el síndrome de marcapaso.

23. una de las siguientes técnicas quirúrgicas no es válida para tratar una rigidez articular de rodilla ni anquilosis ósea:

- A. operación de Trillat
- B. operación de Thompson
- C. operación de Judet
- D. operación de Payr

24. con referencia a la fluidoterapia en la hipovolemia:

- A. la relación de volumen cristaloides/coloides ha de ser 3:1
- B. del volumen de coloides infundido, permanece el 20% en el espacio intravascular
- C. del volumen de cristaloides infundido, permanece el 80% en el espacio intravascular
- D. la relación de volumen coloides/cristaloides ha de ser 3:1

Want the other 3678+ questions & full timed mock exams? Unlock at
<https://certs.theorypractice.app/medicina-general>

25. en un paciente con prótesis de cadera, en los tres primeros meses, debe evitar las siguientes posturas excepto:

- A. separación o abducción de la extremidad intervenida
- B. adducción de la extremidad intervenida más allá de la línea media
- C. flexión de cadera $>90^\circ$
- D. flexión con rotación interna de la extremidad intervenida



Unlock all 3708 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/medicina-general>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start



26. la ordenación del régimen del personal Estatutario de los Servicios de Salud se rige por el principio de:

- A. igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso a la condición de personal estatutario.
- B. integración en la Administración Pública de la que depende el servicio de salud respectivo.
- C. dedicación no prioritaria al servicio público.
- D. participación de las Organizaciones Sindicales en la determinación de las condiciones de trabajo a través del ejercicio del derecho de huelga.

27. ¿Cuáles de los siguientes es más importante en un programa de reeducación intestinal?

- A. todos son importantes
- B. estímulo rectal para desencadenar la defecación
- C. evaluar medicaciones que inhiben la motilidad intestinal
- D. seleccionar el momento del día y posición adecuada

Study offline on the free app — search your exam on the App Store or Google Play

28. señale la respuesta correcta, respecto a los estiramientos postisométricos.

- A. técnica que requiere una pequeña colaboración por parte del paciente.
- B. indicados en el tratamiento de la atrofia muscular.
- C. aumentan la resistencia a la fatiga de los músculos fásicos.
- D. indicada en el tratamiento de las contracturas de origen fibromiálgico.

29. señale la opción falsa en relación al dolor cervical asociado al latigazo cervical:

- A. se limita a la región suboccipital
- B. la aparición inmediata tras la colisión indica mal pronóstico
- C. es el síntoma más frecuente en la fase aguda
- D. el recorrido articular cervical establece el pronóstico de las lesiones

30. no es propio de una pulpitis reversible:

- A. dolor a la percusión
- B. dolor de breve duración
- C. dolor provocado por estímulos
- D. dolor fácilmente localizable



Unlock all 3708 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/medicina-general>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start



Answer Key & Explanations

You just practised 30 of 3708. Unlock every question + timed mocks at
<https://certs.theorypractice.app/medicina-general>

1. A — tumos de Wilms.
2. A — hipercalcemia.
3. A — adenopatías.
4. A — esclerosis múltiple
5. A — eritropoyesis ineficaz.
6. A — fómite.
7. A — no tiene factores desencadenantes.
8. A — cualquiera de las demás respuestas
9. A — alta reactividad
10. A — si la esfinterotomía es amplia, no es necesaria la colocación de endoprótesis o drenaje nasobiliar.
11. A — la comorbilidad con la depresión es la más frecuente
12. A — síndrome de Weill-Marchesani.
13. A — la histología muestra necrosis de los estratos epidérmicos superiores
14. A — una cornea normal es prolata y con un valor de asfericidad Q de -0.12
15. A — hematíes denaturalizados-Tc99m.
16. A — tiene interés pronóstico
17. A — paracetamol
18. A — las fibras maculares nasales cruzan en la en la parte anterior del quiasma.
19. A — la anticoagulación crónica en la FA solitaria está indicada preferentemente en pacientes jóvenes (< 60 años) y sin factores de riesgo.
20. A — R5-30 cmH2O
21. A — es la inhibición inapropiada del canal ventricular por detección del estímulo auricular
22. A — es una taquicardia mediada por el marcapaso.
23. A — operación de Trillat
24. A — la relación de volumen cristaloides/coloides ha de ser 3:1



Unlock all 3708 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/medicina-general>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start

Unofficial study material · not affiliated with any certifying body



- 25. A — separación o abducción de la extremidad intervenida
- 26. A — igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso a la condición de personal estatutario.
- 27. A — todos son importantes
- 28. A — técnica que requiere una pequeña colaboración por parte del paciente.
- 29. A — se limita a la región suboccipital
- 30. A — dolor a la percusión



Unlock all 3708 questions + timed mock exams
→ <https://certs.theorypractice.app/medicina-general>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start

Unofficial study material · not affiliated with any certifying body



Ready to pass?

Unlock the full Medicina General bank, every explanation, and unlimited timed mock exams.

Scan to start practising

<https://certs.theorypractice.app/medicina-general>

Also on iOS & Android — search your exam name on the App Store or Google Play



Unlock all 3708 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/medicina-general>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start